

Blærekræft overses hos kvinder

Lægerne opdager ikke blærekræft hos mange kvinder og behandler i stedet for blærebetændelse. Overlæge Peter Thind fra Rigshospitalet mener, de praktiserende læger bør være mere opmærksomme.

For et år siden blev Blæreforeningen etableret som patientforening med henblik på at sætte fokus på blærekræft og løfte kvaliteten af behandlingen på niveau med international standard. Blæreforeningen blev hurtigt bevidst om, at der mangler viden hos de praktiserende læger, idet mange af foreningens nye medlemmer samstemmende kunne berette, at den praktiserende læge havde stillet en forkert diagnose. Medlemmer, som har fået konstateret blærekræft – især kvinderne – gik alt for længe med en ubehandlet kræftsygdom.

Blod i urinen kan være tegn på alvorlig sygdom

"Uden at ville klandre de praktiserende læger generelt, så går det ofte galt, fordi blod i urinen mistolkes som blærebetændelse. Forklaringen kan være, at de praktiserende læger ser en del patienter, især yngre kvinder, med blod i urinen som skyldes blærebetændelse," siger Peter Thind, specialist i blærekræft ved Rigshospitalets urologiske afdeling.

"Er der tale om synligt blod i urinen bør det undersøges nærmere," fortsætter overlægen, som indprenter sine studerende, at "blod i urinen er blod i urinen – og blod i urinen skal undersøges".

En nærmere undersøgelse for blærekræft sker på en urologisk afdeling, hvor patienten kan få en røntgenundersøgelse af urinvejene og kikkertundersøgelse af blæren. Desværre sker det ofte at patienten henvises til ultralydsscanning, som i denne sammenhæng er uden mening og kun vil forlænge udredningstiden. Peter Thind oplyser, at omkring 30 % af de patienter, som kommer til afdelingen og har blod i urinen, får konstateret en eller anden form for kræft.

For lang tid før patienter bliver henvist til urologisk undersøgelse. Alt for mange går i flere måneder eller længere før vedkommende bliver henvist til en urologisk undersøgelse. I dette tidsrum vil sygdommen have mulighed for at udvikle sig og vil eventuelt resultere i et



mere omfattende indgreb og kan i værste fald betyde, at patienten på sigt dør af sin sygdom.

Peter Thind undrer sig over, at de praktiserende læger gentagne gange giver kure med antibiotika frem for at henvisse patienterne til en urologisk afdeling, hvor speciallæger forholdsvis let og hurtigt kan konstatere om der er tale om blærekræft eller andre alvorlige behandlingskrævende sygdomme.



BLÆREFORENINGEN

FOR PATIENTER MED POLYPPER ELLER
BLÆREKRÆFT OG DERES PÅRØRENDE

Blærekræft er en af de mest belastende sygdomme både for patienterne, de pårørende og sundhedsvæsenet. Der er behov for at sætte mere fokus på denne sygdom.

Derfor er der stiftet en patientforening, som samarbejder med Kræftens Bekæmpelse.

Blæreforeningens har bl.a. følgende formål:

- At støtte og vejlede patienter af begge køn og deres pårørende
- At øge kendskabet til sygdommen
- At forbedre kommunikationen mellem behandlere og patient
- At oprette lokale netværk overalt i landet

Informationsmøder:

I 2008 afholdes informationsmøder i Fredenksund, Roskilde, Herlev, på Rigshospitalet, i Odense og Århus.

Yderligere information og tilmelding:

BLÆREFORENINGEN
Frydenbøvej 3
1955 Frederiksberg C

Tlf: 33 26 95 20
Mail: info@blaere.net
www.blaere.net

I samarbejde med



Kræftens Bekæmpelse

Fakta om blærekræft

- 13.000 mennesker er i livslang behandling for sygdommen
- 3.000 får taget vævsprøver fra blæren under fuld bedøvelse årligt
- 6.000 fik fjernet en eller flere tumorer i 2005
- Ca. 10 % kommer i kemoterapi
- 206 mennesker fik fjernet blæren i 2005
- Der opstår 1.700 nye tilfælde årligt – heraf 400 kvinder
- Vigtigste symptom er blod i urinen
- Rygning er vigtigste årsag

www.blaere.net

